

نقش کبد در بدن

کبد شما یکی از مهمترین اعضای بدن است که نقش حیاتی در زندگی شما ایفا می‌کند. وظیفه اولیه کبد تصفیه هر چیزی است که شما می‌خورید. کبد در مراقبت از عفونت‌ها کمک می‌کند و میکروها و سایر مواد سمی را از خون شما خارج کرده و به حفاظت سلامت شما کمک می‌کند. همچنین کبد مسئول دخیره انرژی برای حرکت در آوردن عضلات و کنترل قند خون و تنظیم کلسترول و نیز مسئول کنترل چندین هورمون و آنزیم دیگر است.

هپاتیت چیست؟

هپاتیت که از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است می‌تواند در اثر عوامل مختلف از جمله بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پیدا شود. هپاتیت «سی» نوعی بیماری کبدی است که در اثر عفونت دارند، معتادان تزریقی هستند. بررسی از نظر عفونت HIV نیز مهم است. هپاتیت «سی» از ویروس هپاتیت «سی» می‌شود. این ویروس همچنین می‌تواند موجب آسیب‌های دائمی کبد مثل سیروز (تنبلی کبد)، سرطان کبد و نارسایی کبد گردد. بسیاری از بیماران تا زمانیکه دچار آسیب کبدی شوند، از بیماری خود ب اطلاع هستند و این امر ممکن است چندین سال پس از آنکه شدن فرد به ویروس هپاتیت «سی» رخ دهد. بالاصله پس از اینکه فردی به ویروس هپاتیت «سی» آنکه شده وارد مرحله کوتاه مدت و ابتدایی بیماری می‌گردد. در بعضی افراد پس از این مرحله ویروس هپاتیت به طور دائمی از بدن پاک شده و هرگز مشکل کبدی پیدا نمی‌آید ولی حدود ۸۵ درصد افرادی که به این ویروس مبتلا می‌شوند وارد فاز پیشرفتی و طولانی مدت بیماری می‌شوند.

ابتلا به هپاتیت «سی» چگونه رخ می‌دهد؟

بیماری هپاتیت «سی» توسط ویروس هپاتیت «سی» ایجاد می‌گردد. این ویروس پس از تماس جنسی غالباً در افرادی که شرکای جنسی متعددی دارند دیده می‌شود. با توجه به شباهت راههای انتقال هپاتیت و ویروس عامل بیماری ایدز، بسیاری از مبتلایان به ویروس ایدز بطور همزمان به ویروس هپاتیت «بی» و «سی» هم آنده اند، که این امر موجب تشديد علائم و مشکلات بیماران و کوتاه‌تر شدن عمر آنان می‌شود.

اگر لباس کسی آغشته به خون بیمار مبتلا به هپاتیت بی یا سی شود، چه اقداماتی باید انجام داد؟
در صورتیکه لباس یا هر شیئی دیگری که خون فرد آنکه آغشته شود، در ابتدا باید خون را با آب سرد در حالی که دستکش به دست است کاملاً شست. چون ویروس در خون خشک شده هم‌تا مدتی باقی می‌ماند، بنابراین باید خون کاملاً پاک شود. سپس با دو روش می‌توان وسیله را ضدغوفونی کرد:

استفاده از مواد ضدغوفونی کننده مانند مایعات سفید کننده و مواد کلردار برای مدت ۲۰ دقیقه.
جوشاندن برای مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه.

آیا برای مبتلایان به هپاتیت سی محدودیتی از نظر ازدواج وجود دارد؟

یکی از راههای انتقال هپاتیت «سی»، می‌تواند انتقال از راه تماس جنسی با فرد آنکه باشد، ولی شناس این انتقال بسیار پایین است، بطوریکه در اغلب موارد هپاتیت «سی» از همسر به طرف مقابل منتقل نمی‌شود. بنابراین فرد آنکه به هپاتیت «سی» می‌تواند ازدواج کند و می‌تواند بچه دار شود ولی توصیه‌های بهداشتی را رعایت کند. افراد متاهل جهت بچه دار شدن، با پزشک معالج خود مشورت کنند.

دربافت خون یا عضو اهدائی آنکه قبل از سال ۱۳۷۵ می‌باشد.

تماس پزشکان و کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی با خون فرد آنکه.

در موارد نادر از مادر آنکه به هپاتیت «سی» به نوزادش در جین زایمان.

اگر شک به ابتلای خود به هپاتیت «سی» دارید، از اهداء خون خودداری کرده و آزمایش دهید.

آیا وجود یک فرد ناقل در منزل خطرناک است؟

در صورتیکه دستورات ساده بهداشتی رعایت شود، شناسی برای انتقال هپاتیت «سی» بین افراد خانواده باقی نمی‌ماند.

چه مواردی در پیشگیری از انتقال ویروس نقش بسزایی دارند؟

- زخم و بریدگی‌های پوست را خودتان پانسمان کنید. در صورت نیاز به کمک برای پانسمان زخم از دستکش استریل استفاده شود.
- در صورتیکه به این بیماری مبتلا هستید، خون، پلاسمای اعضای بدن یا بافت اهدا نکنید.
- از سرنگ مشترک استفاده نکنید.
- از ریش تراش، مسواک و لوازم آرایش یا لوازم شخصی دیگران بطور مشترک استفاده نکنید.
- مواضع باشید در داخل خانه به صورت اشتباهی از مسواک همدیگر به صورت مشترک استفاده نکنید.
- بهتر است محل نگهداری مسواک‌ها رنگ آنها متفاوت باشد.
- بیان داشته باشید هپاتیت «سی» و اکسن ندارد لذا پیشگیری از آنکه دیگران با عمل به توصیه‌های بهداشتی بر عهده شماست.

علائم و نشانه‌ها

دو نوع هپاتیت «سی» وجود دارد، نوع اول هپاتیت «سی» حاد نامیده می‌شود و به معنی عفونت کوتاه مدت است. علائم این مرحله شبیه آفولانزای خفیف است. نوع دوم که هپاتیت «سی» مزمن نامیده می‌شود به این معناست که فرد به نوعی عفونت جدی تر و طولانی مدت مبتلا شده است. اکثر بیماران وارد مرحله مزمن می‌شوند ولی همچنان بدون علامت باقی می‌مانند، به معین علت در بسیاری از موارد دیده می‌شود که فرد تا ۱۵ سال با بیشتر تشخیص داده نشده باقی می‌ماند و به صورت اتفاقی، بعد از اهداء خون یا بررسی کامل پزشکی متوجه ابتلا به هپاتیت «سی» می‌گردد و افراد بدون علامت هستند.

علائم هپاتیت «سی» ممکن شامل موارد زیر باشد:

خستگی، تب اندک، سردرد، گلو درد خفیف، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ، درد قسمت فوقانی راست شکم (روی کبد)، درد مفاصل، خارش پوست، درد عضلانی، ادرار پررنگ و زردی (حالتی که در آن پوست و سفیدی چشم بیمار به سمت زردی می‌رود).

هپاتیت «سی» به آهستگی موجب آسیب کبد بیمار می‌شود.

حدود ۸۵ درصد افرادی که وارد مرحله مزمن بیماری می‌شوند، پس از ۲۰ سال یا بیشتر دچار آسیب شدید کبدی و اسکار کبدی (سیروز) می‌شوند.

متاسفانه برخی از ورزشکاران جهت تزریق داروهای تقویتی از سرنگ مشترک استفاده می‌کنند که یکی از راههای ابتلا می‌باشد. شایعترین راه انتقال هپاتیت «سی» روش تزریقی است که بیش از ۵۰ درصد موارد را شامل می‌گردد. انتقال هپاتیت «سی» از راه جنسی نسبت به هپاتیت «بی» کمتر است. شیردهی موجب انتقال هپاتیت «سی» نمی‌شود.

باید توجه داشت که در ۲۰ درصد موارد، علت برای ابتلا یافتن نمی‌شود.

آیا ممکن است فردی هم هپاتیت «سی» داشته باشد و هم «بی»؟

با توجه به راه‌های مشترک انتقال این دو ویروس پاسخ مثبت است. اغلب کسانی که آنکه به هر دو ویروس را مختلط، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پیدا شود.

آیا وکسنسی برای جلوگیری از انتقال هپاتیت «سی» وجود دارد؟

ناکنون وکسنسی ساخته نشده که بتواند در برابر ویروس هپاتیت «سی» مصونیت ایجاد کند.

کدام ویروس هپاتیت بیشتر از راه جنسی منتقل می‌شود؟

ویروس هپاتیت «بی» بیش از هپاتیت «سی» از راه تماس جنسی منتقل می‌شود. موارد هپاتیت «سی» ناشی از تماس جنسی غالباً در افرادی که شرکای جنسی متعددی دارند دیده می‌شود. با توجه به شباهت راههای انتقال هپاتیت و ویروس عامل بیماری ایدز، بسیاری از مبتلایان به ویروس ایدز بطور همزمان به ویروس هپاتیت «بی» و «سی» هم آنده اند، که این امر موجب تشديد علائم و مشکلات بیماران و کوتاه‌تر شدن عمر آنان می‌شود.

اگر لباس کسی آغشته به خون بیمار مبتلا به هپاتیت بی یا سی شود، چه اقداماتی باید انجام داد؟

در صورتیکه لباس یا هر شیئی دیگری که خون فرد آنکه آغشته شود، در ابتدا باید خون را با آب سرد در حالی که دستکش به دست است کاملاً شست. چون ویروس در خون خشک شده هم‌تا مدتی باقی می‌ماند، بنابراین باید خون کاملاً پاک شود. سپس با دو روش می‌توان وسیله را ضدغوفونی کرد:

استفاده از مواد ضدغوفونی کننده مانند مایعات سفید کننده و مواد کلردار برای مدت ۲۰ دقیقه.


جوشاندن برای مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه.

آیا برای مبتلایان به هپاتیت سی محدودیتی از نظر ازدواج وجود دارد؟

یکی از راههای انتقال هپاتیت «سی»، می‌تواند انتقال از راه تماس جنسی با فرد آنکه باشد، ولی شناس این انتقال بسیار پایین است، بطوریکه در اغلب موارد هپاتیت «سی» از همسر به طرف مقابل منتقل نمی‌شود. بنابراین فرد آنکه به هپاتیت «سی» می‌تواند ازدواج کند و می‌تواند بچه دار شود ولی توصیه‌های بهداشتی را رعایت کند. افراد متاهل جهت بچه دار شدن، با پزشک معالج خود مشورت کنند.

هپاتیت سی

Hepatitis C Virus



www.meldcenter.com

دکتر سید مولید علیان
استاد و فوق تخصص گوارش و کبد



برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به کتاب راهنمای جامع هپاتیت سی برای عموم مردم از سایت
hophealthclub.com و meldcenter.com مراجعه نمایید

درمان دارد، لذا پیشنهاد می شود تمامی بیماران مبتلا به هپاتیت «سی» برای جلوگیری از پیشرفت آسیب کبدی، هرچه زودتر درمان شوند. امروزه هپاتیت «سی» کاملاً قابل درمان است و در صورت مصرف دقیق دارو تثبیت نظرات پژوهش، این ویروس بطور کلی از بدن بیمار پاک می شود. در اکثر موارد قابل درمان است و میزان پاسخ به درمان، به میزان آسیب کبدی بیمار، مقدار ویروس موجود در بدن وی و نوع ویروس هپاتیت «سی» که فرد به آن مبتلا شده است بستگی دارد. شش نوع مختلف از ویروس هپاتیت «سی» وجود دارد، نوع ۱، ۲ و ۳ در سراسر جهان یافت می شود، نوع ۴ در آفریقای شمالی دیده می شود، نوع ۵ در آفریقای جنوبی و نوع ۶ در آسیا شایع است. بخش مهمی از درمان هپاتیت «سی» به مراقبت فرد از خود بستگی دارد. بیمار می تواند با انجام ورزش، مصرف غذا و میوه های سالم، ترک دخانیات، پرهیز از مصرف الکل، مواد مخدر و داروهایی که موجب آسیب کبدی می شوند، از آسیب بیشتر کبد جلوگیری کرده و وضعیت بهتری داشته باشد.

درمان های جدید هپاتیت سی را بشناسید

امروزه با توجه به کشف داروهای جدید و تاثیر بسیار بالای آنها در ریشه کنی هپاتیت سی، باید درمان قطعی بیماری امیدوار بود. در سابقه از داروهای تزریقی مثل آلفا ایترنوفرون استفاده می شد که با عوارض زیادی همراه بوده است. خوشبختانه داروهای جدید با وجود تاثیر نزدیک به ۱۰۰ درصد با عوارض کمی همراه می باشند. اولین داروی مهم که در سال ۲۰۱۶ در دسترس جامعه قرار گرفت، داروی سوفوسوبویر (Sofosbuvir) بود. این قرص از مهارکننده های مهم هپاتیت سی بوده و به صورت قرص های ۴۰ میلی گرمی همراه با سایر داروها استفاده می شود. داروی بعدی، لیدیاسوبویر (Ledipasvir) (Mi) باشد که قرص ۹۰ میلی گرمی آن همراه با داروی Sofosbuvir در انواعی از عقوبات هپاتیت سی تا ۱۰۰ درصد موارد موثر میباشند. به تدریج داروهای دیگری از قبیل داکلاتاسوبویر (Daclatasvir)، ویکیراپک (Viekirapak)، زپایپر (Zepatier) و داروی جدید ولپاتاسوبویر (Velpatasvir) (معرفی گردیدند. برای نحوه و مدت مصرف این داروها و اینکه آیا همراه با قرص ریباورین مصرف شوند با پژوهش معالج خود در میان بگذارید. تعیین شدن هپاتیت سی در بدن و میزان آسیب کبدی با فیبروسکن و نوع ژنتوتیپ و آنژیم های کبدی می توانند راهنمای پژوهش در تصمیم خود باشد.



سال ۱۴۰۰ رویسه کنی هپاتیت سی در ایران

تشخیص هپاتیت «سی»

هپاتیت «سی» با بررسی شرح حال بیمار، معاینه وی و آزمایش های خونی تشخیص داده می شود. غالباً میزان آنژیم های کبدی در خون مبتلایان به هپاتیت «سی» بالا است. هنگامی که پژوهش به هپاتیت «سی» مشکوک شود، وجود آتنی بادی های ضد هپاتیت «سی» در خون بیمار بررسی می نماید. در صورتیکه آتنی بادی های ضد هپاتیت «سی» در خون بیمار وجود داشته باشد، برای تشخیص قطعی هپاتیت «سی» باید خون بیمار با آزمایش ریبا و پی-سی-آر مورد بررسی قرار گیرد. وجود آتنی بادی های ضد ویروس هپاتیت «سی» در خون بیمار شانگر بیمار نشان می دهد که وی در حال حاضر مبتلا به هپاتیت «سی» است. ویروس هپاتیت «سی» انسانی دارد و به همین دلیل قبل از شروع درمان بررسی ژنتوتیپ ضروری است. انجام شمارش ویروس قبل از درمان و پیگیری کبد شده است یا خیر، فیبرو اسکن انجام می شود.

در چه مواردی باید جهت بررسی ابتلا به هپاتیت «سی» به پژوهش مراجعه کرد؟
فکر می کنید به هپاتیت «سی» مبتلا شده اید.

دارای عوامل خطر ابتلا به هپاتیت «سی» (مانند تزریق و ریدی) هستید.

دچار علائم هپاتیت «سی»، (خستگی، درد عضلانی، کاهش اشتها، تهوع، ادرار پررنگ، مدفوع کم رنگ، تب، یا زردی) بوده و مشکوک به تماس با فرد مبتلا به هپاتیت «سی» هستید.

تست خانگی شما از نظر هپاتیت «سی» مثبت شده است.

در چه مواردی بیمار مبتلا به هپاتیت «سی» باید با اورژانس تماس بگیرد:

خونریزی از مقدع یا استفراغ خونی

در موارد گیجی شدید یا توهمند

به طور منظم بیگیر بیماریتان باشید چون هپاتیت «سی» می تواند بدون تظاهرات بالینی به کبد آسیب برساند در صورت ابتلا به این بیماری هرچه زودتر با پژوهش خود موضوع را در میان بگذارید. طبیب و تیم مراقبت های بهداشتی شما را تحت نظر قرار می دهدند. آنها نتایج تحقیقات جدید در مورد هپاتیت «سی» و انواع درمان هپاتیت «سی» را با شما در میان می گذارند و آگاهی های لازم را جهت پیشگیری از انتقال ویروس به دیگران را به شما خواهند داد.

دraman هپاتیت «سی»

هپاتیت «سی» با داروهای خوراکی جدید قابل درمان است و در تمامی موارد نیاز به

۴