



ГЕПАТИТ С



www.MELDcenter.com

Профессор Сэйед Моайед Алавиян



Профессор Сэйед Моайед Алавиян

Профессор, Доктор медицинских наук,

Декан в институте Гастроэнтеролог,

Гепатолог, Специалист по пищеварительной
системе и печени.

ГЕПАТИТ С

**Профессор Сэйед Моайед
Алавиян**


Профессор, Доктор медицинских наук,
Декан в институте Гастроэнтеролог,
Гепатолог, Специалист по пищеварительной
системе и печени.

ТЕГЕРАН; улица Сэпахбодэ Карани, выше Талагани,

на углу перекрёстка Шадаб, № 178

телефон: +98 21-88945186-7, Факс: +98 21-88945188

www.meldcenter.com



ГЕПАТИТ С

Функция печени в организме


Печень-это самый важный внутренний орган, который играет очень важную роль в вашей жизни. Печень отвечает за переработку практически всего, что вы съедаете, обезвреживает вредные для организма вещества, и выводит токсины из крови, чем очень помогает вашему организму. Также, печень, перерабатывает вещества, поступающие в организм с пищей и жидкостью, в энергию и „строительные блоки“, для мышц, контролирует сахар в крови, нормализует уровень холестерина, контролирует гормоны и другие ферменты.

ЗДОРОВЬЕ ОРГАНИЗМА ЗАВИСИТ ОТ ПЕЧЕНИ. Это огромный переработчик и фильтр организма от токсинов!

Что такое гепатит?


Гепатит в общем виде, понятие, характеризующее воспаление печени, которое может быть вызвано вирусами, токсичными или химическими веществами, многими препаратами, генетическими болезнями или рядом других факторов. Гепатит С – это вид болезни печени, который возникает вследствии заражения вирусом гепатита С. Вирус гепатита С живёт в клетках печени, чем вызывает воспаление печени (гепатит). Этот вирус может привести к тяжёлому поражению печени, такому как циррозу печени или раку печени (больше информации, вы сможете найти в книге „Все болезни и расстройства печени в Иране“.). Большинство больных, даже не подозревают о своей болезни, пока не начнут появляться

Функция печени в организме



ГЕПАТИТ С

СИМПТОМЫ,СВЯЗАННЫЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ. И поэтому может только по прошествии многих лет,после заражения человека вирусом гепатита С,он может проявиться.



СРАЗУ,ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С,начинается короткий инкубационный период,и болезнь

входит в начальную стадию(острая фаза). У некоторых людей,после этой стадии вируса гепатита,органи зм,самостоятельно перерабатывает вирус,без повреждения печени,и полностью очищается от вируса. Но у около 85% людей,заражённых этим вирусом,болезнь переходит в активную и длительную стадию(хронический гепатит).

Исследования Всемирной Организации Здравоохранения,показали,что около 170 миллионов хронических



Как передаётся гепатит С?


НОСИТЕЛЕЙ ГЕПАТИТА С, ПРОЖИВАЮТ В МИРЕ. И БОЛЬШЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА ЕЖЕГОДНО, УМИРАЮТ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕПАТИТА.

В тюрьмах Ирана в 1379(2000) году, эпидемия гепатита составляла около 20%, но с распространением одноразовых шприцев, отбывающим срок, и замены их зависимости с уколов на другие препараты, это существенно понизило показатели этой болезни, так, что в 84(2005) году, только около 5% инъекционных наркоманов были инфицированы вирусом гепатита С. Переливание крови или её компонентов до 1375(1995) года, могло быть одной из причин заражения.

Важно помнить, что гепатит С очень опасная болезнь, но с подходящим вам лечением и регулярными обследова-

ниями у врача, а также с изменением образа жизни самого больного, эти пациенты могут жить полноценной жизнью. Но помните, что профилактика болезни, намного легче и дешевле, чем её лечение.

Дорогие ветераны войны нашей страны, которые во время ранения были оперированы на месте, и им была перелита кровь, находятся в группе риска заражения гепатитом С. Все, кто имеет прошлый опыт переливания крови, должны пройти обследование у врача и сдать анализы.



ГЕПАТИТ С

Как передаётся гепатит С?

Болезнь гепатита С, появляется от вируса гепатита С. Этот вирус, после контакта с кровью больного гепатитом С, попадает в организм. Заразить вирусом гепатита С, можно только при попадании инфицированной крови, в кровь здорового человека. Но при объятии, поцелуях, кашле или чихании, при пользовании общими столовыми приборами или стаканами, гепатит С не передаётся при бытовом контакте. Вирус гепатита С вне организма и в засохшей крови, выживает 3 месяца, но при кипячении в воде с температурой 100 градусов сантиграда, в течении 5 минут, вирус полностью исчезает.

Также есть риск заражения гепатитом С, в следующих случаях;

- ✓ при совместном использовании шприцов или других инъекционных приспособлений для введения препаратов или наркотиков. Это самый распространённый способ передачи вируса гепатита С во многих странах.
- ✓ татуировки, прокалывание ушей и других частей тела, хэджамат (традиционное кровопускание), услуги медицинских работников, также стоматологов, в местах, где не соблюдены общие меры предосторожности и используемые инструменты не были подвергнуты надлежащей стерилизации.

Может ли быть у человека гепатит С и гепатит Б, одновременно?

- ✓ ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ ИЛИ ЕЁ КОМПОНЕНТОВ до 1375(1995) ГОДА.
- ✓ КОНТАКТ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И ПЕРСОНАЛА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, С КРОВЬЮ ИНФИЦИРОВАННОГО ЧЕЛОВЕКА.
- ✓ ОТ МАТЕРИ, ИНФИЦИРОВАННОЙ ГЕПАТИТОМ С-РЕБЁНКУ, ВО ВРЕМЯ РОДОВ.
- ✓ ЕСЛИ ВЫ ПОДОЗРЕВАЕТЕ, ЧТО ИНФИЦИРОВАННЫ ГЕПАТИТОМ С, ТО НЕ СДАВАЙТЕ КРОВЬ, В ПУНКТЫ ПРИЁМА ДОНОРСКОЙ КРОВИ И СДАЙТЕ НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ.

Самый распространенный
путь передачи гепатита
С-инъекционный, больше

50% случаев. Риск передачи гепатита С вследствии половых отношений, намного меньше, по сравнению с гепатитом Б. Гепатит С не передаётся посредством грудного кормления.

Может ли быть у человека гепатит С и гепатит Б, одновременно?

В связи с тем, что у этих двух вирусов одинаковые пути передачи, то ответ-положительный. Обычно люди, которые инфицированы этими двумя вирусами, это инъекционные наркоманы, поэтому очень важно пройти тест на ВИЧ(HIV).

- Существует ли вакцина, способная

ГЕПАТИТ С

ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С?

ПОКА ЕЩЁ НЕ СОЗДАНО ВАКЦИНЫ, СПОСОБНОЙ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С.

➤ Какой из вирусных гепатитов больше передаётся половым путём?

Вирусный гепатит Б подвержен большему риску передачи половым путём чем гепатит С. Особенno риск инфицирования повышается у лиц, имеющих многочисленных половых партнёров. Посколько пути передачи вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), одни и те же, многие инфицированны

вирусом гепатита Б, гепатита С и ВИЧ одновременно, что значительно осложняет лечение, потому что повреждение печени происходит быстрее, чем уменьшает показатели жизни.

➤ Что нужно делать, если кровь человека, инфицированного гепатитом Б или С, попадает на одежду?

В случае, если кровь инфицированного человека попадает на одежду или что-то ещё, то в первую очередь нужно надеть одноразовые перчатки и промыть кровь холодной водой. Необходимо полностью смыть всю кровь, потому что вирус остаётся и в высохшей крови.

ПРОКИПЯТИТЬ ВЕЩИ ОТ 20 до 30 минут.

ПОСЛЕ ЭТОГО ЕСТЬ ДВА ВИДА,
ЧТОБЫ ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ ВЕЩИ;

1-ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ,ОТБЕЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ ИЛИ СРЕДСТВ С СОДЕРЖАНИЕМ ХЛОРА. ЗАМОЧИТЬ НА 20 МИНУТ.

2-ПРОКИПЯТИТЬ ВЕЩИ ОТ 20 до 30 МИНУТ.


➤ Есть ли ограничения для инфицированного гепатитом С, в плане создания семьи?

Одним из путей передачи гепатита С, могут быть половые отношения с инфицированным, однако процент передачи вируса **очень низок**, настолько, что в большинстве случаев гепатит С не пе-

редавался партнёру инфицированным супругом. Так что человек, инфицированный гепатитом С, может создавать семью, планировать детей, но соблюдая все меры предосторожности и рекомендации врача.

➤ Опасно ли, если вирусонаситель находится в доме?

В случае, если соблюдать простые санитарные нормы, то не останется никаких шансов зараже-



ГЕПАТИТ С

НИЯ ГЕПАТИТОМ С В СЕМЬЕ. РОЛЬ САМОГО БОЛЬНОГО, В ПРОФИЛАКТИКЕ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ, ИГРАЕТ ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЛЬ.

ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ПО ПРИЧИНАМ ОПРЕДЕЛЁННЫХ СВОЙСТВ ЭТОГО ВИРУСА, УЧЁНЫЕ НЕ СМОГЛИ СОЗДАТЬ ВАКЦИНЫ, СПОСОБНОЙ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАРАЖЕНИЕ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С. К СОЖАЛЕНИЮ, ИНФИЦИРОВАННЫЕ ЭТИМ ВИРУСОМ НЕ ТАК ПРОСТО ПОДДАЮТСЯ ЛЕЧЕНИЮ. ПОЭТОМУ НУЖНО СДЕЛАТЬ ВСЁ, ЧТОБЫ С СОБЛЮДЕНИЕМ НАДЛЕЖАЩЕЙ ГИГИЕНЫ, ПРЕДОТВРАТИТЬ ПЕРЕДАЧУ ВИРУСА ДРУГИМ.

➤ Следующие факты играют очень важную роль в профилактике передачи вируса;



- Обязательно обрабатывайте и перевязывайте ваши раны и порезы на коже. В случае, если нужна помощь для обработки и перевязки ран, попросите исполь-

Симптомы гепатита С

ЗОВАТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПЕРЧАТКИ.

- В случае, если вы инфицированы этой болезнью, не сдавайте донорской крови, плазмы, органов, частей или тканей тела.
- Не пользуйтесь общими щипцами.
- Не пользуйтесь общими предметами личной гигиены, такими как станки для бритья, бритвы, зубные щётки, косметика или другие личные вещи.
- Будьте осторожны дома, чтобы по ошибке не использовать зубные щётки друг друга. Лучше, если

ПОМЕНЯТЬ МЕСТА И ЦВЕТ ЗУБНЫХ ЩЁТОК.

- Важно помнить, что у гепатита С пока ещё нет вакцины, и не всегда есть полное лечение от этой болезни. Предотвратить заражение других полностью зависит от соблюдения вами общепринятых санитарных норм и рекомендаций врача.

Симптомы гепатита С

Существует 2 вида гепатита С. Первый вид гепатита С-это острая стадия, что означает быстро наступающую, кратковременную начальную стадию заболевания. Симптомы этой стадии похожи на гриппозное состояние. Второй

ГЕПАТИТ С

вид гепатита С-хронический, что означает, что человек, столкнулся с заболеванием более серьёзным, стойким и длительным. Большинство больных переходят в хроническую стадию болезни, которая протекает без каких-либо симптомов. Поэтому во многих случаях, человек от 15 лет и больше, так и живёт относительно нормальной жизнью, даже ничего не подозревая о болезни. И чисто случайно, после переливания донорской крови или после полного медицинского обследования, узнаёт, что инфицирован вирусом гепатита С. Однако у других людей, хронический гепатит С, может сопровождаться следующими симптомами: утомляемость, небольшая температура, головные боли, слабые боли в горле, потеря аппетита, тошнота, рвота, боль в животе и боль в мышцах или суставах, боль

в подреберье с правой стороны живота (над печенью), сухость кожи, потемнение мочи (состяние, когда кожа и белки глаз больного становятся желтого цвета).

Гепатит С, со временем, приводит к поражению печени больного. У около



ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГЕПАТИТА С.

85% больных хроническим гепатитом С, после 20 лет и более, наблюдаются тяжелые нарушения печени, фиброз печени (цирроз). Основные проявления цирроза, это:

- Покраснение ладоней (в связи с расширением сосудов на ладонях).
- На груди, плечах, спине и лице, появляются красные пятна, похожие на маленьких красных паучков.
- Отекают живот, ноги и лицо.
- Кровотечения из расширенных вен пищевода, которое называется

варикозным кровотечением и сопровождается меленой (чёрным калом), в котором видна кровь.

- Нервно-психические нарушения, которые называются – энцефалопатией. Энцефалопатия может сопровождаться такими симптомами, как дезориентация в пространстве, спутанность сознания, потеря памяти и чувства бдительности.

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ГЕПАТИТА С.

Тесты на гепатит С, начинаются с обследования состояния больного, и анализы крови помогают определить заражены ли вы вирусом гепатита С, и в какой стадии находится болезнь.

ГЕПАТИТ С



Количество ферментов печени ,в крови инфицированного человека обычно высокое. Когда врач подозревает наличие гепатита С, он обязательно проверяет наличие антител против гепатита С(HCV Ab) в крови больного. Если антитела против гепатита С,присутствуют в крови пациента,то для полного подтверждения диагноза

гепатита С,кровь больного тестируют с RIBA , PSR и HCV RNA тестами. Присутствие в крови антител к вирусу гепатита С,показывает,что в прошлом у человека был контакт с этим вирусом. Чтобы подтвердить наличие хронической инфекции у лиц,имеющих антитела к вирусу гепатита С,необходимо проведение генетического анализа,на наличие в крови самого вируса. В случае подтверждения генетического теста(HCV RNA) гепатита С,в крови больного,показывает,что человек на данный момент инфицирован гепатитом С.

Вирус гепатита С имеет разные виды,и поэтому,прежде чем начать лечение,нужно обязательно сделать тест на генотип болезни. Подвиды генотипов 1а и 1б более стойкие чем генотипы 2а и 3а.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ИДТИ К ВРАЧУ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С ?

Тесты на вирусную нагрузку(PCR) оказываются очень важной помощью. В большинстве случаев, используется для подтверждения, переходит ли вирус гепатита С в фиброз печени или нет.

Делается биопсия печени(взятие образцов печеночной ткани). Делается эта процедура под местным наркозом, врач вводит тонкую длинную иглу в печень, в место между ребер больного. Отбирается крошечный образец печеночной ткани для обследования под микроскопом. Сама процедура отбора ткани занимает несколько секунд.

- Сегодня, в некоторых странах есть домашние тесты на гепатит С. Так что больной, с помощью этого теста, может

определить, был ли у него контакт с этим вирусом или нет. В случае положительного ответа на тест, необходимо обратиться к специалисту-гепатологу, для полного обследования на гепатит С.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО ИДТИ К ВРАЧУ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С ?

Думаете, что инфицированы вирусом гепатита С?!

- Находитесь в группе риска заражения гепатитом С(как использование внутривенных инъекций).

ГЕПАТИТ С

- Появились симптомы гепатита С(утомляемость, боли в мышцах или суставах, потеря аппетита, тошнота, потемнение мочи и осветление кала, жар или желтизна) и подозреваете, что у вас был контакт с инфицированным гепатитом С.

- Ваш домашний тест на гепатит С, показал положительный ответ.

В каких случаях больной, инфицированный гепатитом С должен обращаться в скорую помощь;

- Кровотечения из заднего прохода или рвота кровью
- В случае полной дезориентации или спутанности сознания

Регулярно проверяйте свою болезнь, потому что гепатит С, без каких либо симптомов, может нанести серьёзный вред вашей печени. В случае заражения этой болезнью, как можно быстрее сообщите об этом вашему лечащему врачу.

Врач и медперсонал возьмут вас под наблюдение. Они сообщат вам данные последних исследований в области лечения этой болезни, а также обсудят с вами варианты лечения гепатита С, и ознакомят с профилактикой передачи вируса другим.

Лечение гепатита С

Гепатиту С, во многих случаях требуется лечение препаратами, и также во многих случаях, лечение этими препаратами не нужно. В случае, если имеется слабое поражение печени, то лечение может быть и не нужно. А также, лечение препаратами, по причине тяжёлых побочных эффектов этих лекарств, и их высокая стоимость, не всегда лучший выбор.

В случае, если лечащий врач рекомендует лечение этими препаратами, то назначается комбинированное лечение интерфероном и рибавирином. Инъекция интерферона делается 3 раза в неделю. Дозы и длительность лечения, могут быть осуществлены только высококвалифицированными

специалистами. Больные, должны сдавать анализы крови и обследоваться у врача как минимум 1 раз в месяц.

Сегодня, учёные представили новый альфа-интерферон, который называется пег-интерфероном, инъекция которого делается 1 раз в неделю. Это дорогое лекарство, но более эффективное. Гепатит С поддаётся лечению, и если с точностью принимать препараты, назначенные лечащим врачом, то есть возможность полного устранения вируса из организма.

Существуют различные виды препарата пег-интерферон на рынке, на сегодняшний день. О выборе вашего препарата, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.

ГЕПАТИТ С

ОТВЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ,ЗАВИСИТ ОТ ;
ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ БОЛЬНОГО,КОЛИЧЕСТВА
ВИРУСА В ОРГАНИЗМЕ,И КАКИМ ВИРУСОМ
ГЕПАТИТА С ИНФИЦИРОВАН БОЛЬНОЙ.

ИМЕЕТСЯ 6 РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ГЕПАТИТА С,КОТОРЫЕ НАЗЫВАЮТСЯ ГЕНОТИПАМИ.
Генотипы 1,2 и 3 ,распространены по
всему миру. Генотип 4-наблюдается в
Северной Африке, 5-в Южной Африке и
6 больше наблюдается в Азии. Лечение
генотипа 1-сложнее,чем лечение
генотипов 2 и 3.

Неотъемлемой составной частью
лечения гепатита С,является
здравый образ жизни;физические
упражнения,здравый
режим питания,фрукты,отказ
от курения,употребления
алкоголя,наркотиков и
лекарств,которые могут нанести вред
печени. Это предотвратит большее

ПОРАЖЕНИЕ ПЕЧЕНИ,И УЛУЧШИТ ОБЩЕЕ
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ.

Рибавирин


Рибавирин-это оральный антивирусный
препарат,используемый только в
сочетании с интерфероном для лечения
гепатита С. Эта комбинированная
терапия даёт результаты,сам по себе
Рибавирин,не эффективен для лечения
против гепатита С. Основной побочный
эффект этого препарата-он оказывает
разрушающее действие на красные
кровяные тельца. Поэтому возможно
в 10 % случаях, лечение должно быть
прекращено. В процессе лечения
рибавирином регулярно следует
сдавать анализы крови и проходить
обследование у лечащего врача.

ИМЕЕТ ЛИ ПОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ПОВОДУ РИБАВИРИНА:
ВО ВРЕМЯ ЛЕЧЕНИЯ РИБАВИРИНОМ,
ЖЕНЩИНАМ, ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА, И
ЖЕНЩИНАМ, ПОЛОВЫМ ПАРТНЁРАМ
МУЖЧИН, ПРИНИМАЮЩИХ РИБАВИРИН-
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНА
ИЗ-ЗА ОПАСНЫХ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ЭТОГО ПРЕПАРАТА. Для большей
информации, обязательно
проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Что такое интерферон-альфа, и как этот препарат действует?

ЭТО ЕСТЕССТВЕННЫЙ
ПРОТЕИН, ВЫДЕЛЯЕМЫЙ КЛЕТКАМИ
ОРГАНИЗМА В ОТВЕТ НА ВТОРЖЕНИЕ
ВИРУСА, ЧТОБЫ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ
РАЗМНОЖЕНИЮ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗМЕ.
ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА, ЭТО



вид человеческого
интерферона, который
стимулирует и добавляет в организм
человека продукцию собственного
интерферона (для большего укрепления
иммунной системы организма).
Использование этого препарата, может
вызвать симптомы, напоминающие
гриппозное состояние, что даже

ГЕПАТИТ С

МОЖЕТ БЫТЬ ОТВЕТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ НА ЛЕЧЕНИЕ. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, ТОЧНО НЕ УСТАНОВЛЕНО, КАК ИМЕННО ЭТО ЛЕЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЕТ НА ХРОНИЧЕСКИЕ ГЕПАТИТЫ Б И С.

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРФЕРОН-АЛЬФА АТАКУЕТ КЛЕТКИ ВИРУСА ГЕПАТИТА, ИЛИ МОЖЕТ РЕГУЛИРУЕТ СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ПОМОГАЯ ТЕМ САМЫМ СОЗДАТЬ ЗАЩИТНЫЙ БАРЬЕР ПРОТИВ ВИРУСА.

КАК НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА?

ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА, ЯВЛЯЕТСЯ ИНЪЕКЦИОННЫМ. ВЫ МОЖЕТЕ САМИ ДЕЛАТЬ СЕБЕ ИНЪЕКЦИИ ИЛИ ПОПРОСИТЬ КОГО-НИБУДЬ, ВРАЧА ИЛИ МЕДСЕСТРУ, СДЕЛАТЬ ВАМ УКОЛ. МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ, ТОЧНО ТАКЖЕ

КАК И ВЫ, САМИ ДЕЛАЮТ СЕБЕ ИНЪЕКЦИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ. ПОМНИТЕ, ЧТО ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ УКОЛОВ, С КАКДЫМ РАЗОМ ВАМ БУДЕТ ЛЕГЧЕ ЭТО ДЕЛАТЬ. НАЧИНАЙТЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА И БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ОЧЕНЬ СКОРО ВЫ К НЕМУ ПРИВЫКНИТЕ.

ИМЕЕТ ЛИ ПОВОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА?

ПРЕВАЛИРУЮЩИМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ЛЕЧЕНИЯ С ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА, ЯВЛЯЮТСЯ НАПОМИНАЮЩИЕ ГРИПП СИМПТОМЫ; БОЛЬ В МЫШЦАХ ИЛИ СУСТАВАХ, ЖАР, ОЗНОБ. Нообычно после нескольких недель применения, симптомы ослабевают. Эти побочные действия препарата

КАК МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ?

СИЛЬНЕЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЮТСЯ В НАЧАЛЕ ЛЕЧЕНИЯ И НЕ ДОЛЖНЫ ВАС ПУГАТЬ. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ О ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЛЕКАРСТВ, О ВАШЕМ СОСТОЯНИИ ИЛИ О ЛЕЧЕНИИ, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ЛЕЧАЩЕМУ ВРАЧУ ЗА ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ДАЖЕ, ЕСЛИ ЛЕЧЕНИЕ В НАЧАЛЕ МОЖЕТ УХУДШИТЬ ВАШЕ СОСТОЯНИЕ, НО ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛНОГО УСТРАНЕНИЯ ВИРУСА ИЗ ОРГАНИЗМА, У ЛЮДЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЕМ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ, НАМНОГО БОЛЬШЕ. ВАЖНО, ЧТОБЫ ВЫ ПРОДОЛЖАЛИ ТО ЛЕЧЕНИЕ, КОТОРОЕ НАЗНАЧИЛ ВАШ ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ. ТОЛЬКО В ЭТОМ СЛУЧАЕ ВЫ МОЖЕТЕ ДОБИТЬСЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ЛЕЧЕНИЯ ИНТЕРФЕРОНОМ-АЛЬФА.

КАК МОЖНО ОБЛЕГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ?

ЧТОБЫ ОБЛЕГЧИТЬ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИНТЕРФЕРОНА-АЛЬФА, СЛЕДУЙТЕ СЛЕДУЮЩИМ ПРАВИЛАМ:

- a) МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ, ТАКИЕ, КАК АСЕТАМИНОФЕН ИЛИ ИБУПРОФЕН, ЧТОБЫ ОСЛАБИТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ КАК ЖАР И БОЛЬ.
- b) ИНЪЕКЦИЯ ИНТЕРФЕРОНА-АЛЬФА НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД СНОМ, ПОМОЖЕТ ВАМ ПЕРЕЖИТЬ САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ ИЗ ПОБОЧНЫХ
- c) БЕРЕГИТЕ ВАШИ СИЛЫ, ПОСТАРАЙТЕСЬ ПОБОЛЬШЕ ОТДЫХАТЬ.

ГЕПАТИТ С

- d) Рекомендуется пить как можно больше жидкости; до начала лечения и во время лечения, пейте больше воды.
- e) Выберите здоровый и хорошо сбалансированный режим питания. Проверяйте количество калорий на каждый прием пищи.
- f) Думайте позитивно, надейтесь на здоровое будущее.

Когда мы сталкиваемся с проблемами в жизни.

Проблемы и трудности всегда присутствуют в жизни. Но вместо криков и жалоб, мы должны научиться, как правильно жить. Крики

и жалобы, кроме сожаления, потере времени и нервно-психических расстройств, ни к чему более не приведут. В этом случае нужно разобраться, как разрешить проблему, и предотвратить появление новых проблем и поражений в будущем, и это привычка думать, показывает преимущество полноценного человека. Одно из правил, предотвратить появление трудностей и поражений



Когда мы сталкиваемся с проблемами в жизни.

В ЖИЗНИ-ЭТО ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ,И КОНЕЧНО БРАТЬ УРОКИ ИЗ ОПЫТА ЖИЗНИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ. ЕСТЬ ПОГОВОРКА,ЧТО ЧЕЛОВЕК,ДОЛЖЕН ОДНИМ ГЛАЗОМ СМОТРЕТЬ В ПРОШЛОЕ,А ДРУГИМ БЫТЬ В НАСТОЯЩЕМ И ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ. Изучение

ИСТОРИИ УЧИТ,КАК ПРИМЕНЯТЬ СЕБЕ НА ПОЛЬЗУ ПРИЧИНЫ ПРОШЛЫХ УСПЕХОВ И ПОРАЖЕНИЙ.


из книги „Точки,,

Доктор Али Реза Ялда

Доктор Сэйед Муайед Алавиян

Инфицированные вирусным гепатитом С,не должны сдавать донорскую кровь.

ГЕПАТИТ С



Профессор Сэйед Моайед Алавиян
Профессор, Доктор медицинских наук,
Декан в институте Гастроэнтеролог,
Гепатолог, Специалист по пищеварительной
системе и печени.

Профессор Сэйед Моайед Алавиян
Профессор, Доктор медицинских наук,
Декан в институте Гастроэнтеролог,
Гепатолог, Специалист по пищеварительной
системе и печени.

